

生産者(連絡先): _____
 部会(年度): _____
 栽培品(品種): みず菜
 栽培基準(ステージ): H30みずな
 圃場・面積(地番): _____

日誌ID [][][][][][][][][][][][][][][][]
 拠点コード 4 0 2 7 帳票ID 6 0 1
 部会コード [][][][] 年度 開始年月 1 8 年 0 4 月 ステージ 0 0
 生産者コード [][][][][][][][][][][][][][][][] 圃場コード [][][][] - [][][][]
 栽培基準ID 0 0 0 0 0 0 0 8 6 2 作 [][][] 栽培面積 [][][][][] . [][] a

チェック	管理作業名 (適用期)	実施月日	コード	項目名	データ	説明	コード	氏名欄 (ボールペン等で自筆) 印	
	播種 播種		〇 〇 1						課長 処理係 センター長 受付係
	収穫開始 収穫		〇 4 1						

使用可能回数… 使用実績… (基準回数内) - (基準回数なし) × (基準回数オーバー)

チェック	用途	防除資材名(基準)	区分	使用月日 月 日	使用月日 月 日	使用月日 月 日	使用月日 月 日	回数	コード
1	殺菌	アミスター20フロアブル 収穫前7日まで 2000倍 2回	白さび病			〇	〇 〇 〇 〇	〇 〇 〇 〇	〇 〇 2 〇 5 7 4
	殺菌	ダコニール1000 播種時 1000倍 1回	立枯病		〇	〇	〇 〇 〇 〇	〇 〇 〇 〇	〇 〇 1 6 8 2 3
	殺菌	Zボルドー 500倍	べと病・斑点細菌病・ 軟腐病・褐斑細菌病・						〇 〇 2 1 1 1 1
	殺虫	アトマイヤーフロアブル 収穫前3日まで 4000倍 2回	アブラムシ類			〇	〇 〇 〇 〇	〇 〇 〇 〇	〇 〇 1 8 5 6 2
5	殺虫	スピノエース顆粒水和剤 収穫前3日まで 5000倍 1回	コナガ		〇	〇	〇 〇 〇 〇	〇 〇 〇 〇	〇 〇 2 〇 1 7 8
	殺虫	ダイアジノン粒剤5 6.0kg/10a 播種時 1回	キスジノミハムシ・ネ キリムシ類・ケラ		〇	〇	〇 〇 〇 〇	〇 〇 〇 〇	〇 〇 1 〇 4 3 8
	殺虫	ダントツ粒剤 6.0kg/10a 播種時 1回	アブラムシ類		〇	〇	〇 〇 〇 〇	〇 〇 〇 〇	〇 〇 2 〇 8 〇 〇
	殺虫	トアローフロアブルCT 収穫前日まで 500倍	オオタバコガ・コナガ・ アオムシ						〇 〇 2 〇 〇 5 6

チェック	用途	防除資材名(基準)	区分	使用月日 月 日	使用月日 月 日	使用月日 月 日	使用月日 月 日	回数	コード
	除草	トレファノサイド乳剤 150.0ml/10a 播種後0日 1回	一年生雑草(ツクサ科、 カヤツリグサ科、		〇	〇	〇 〇 〇 〇	〇 〇 〇 〇	〇 〇 〇 7 3 2 7
10	除草	ナブ乳剤 150.0ml/10a 収穫前7日まで 1	一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く)		〇	〇	〇 〇 〇 〇	〇 〇 〇 〇	〇 〇 1 5 9 9 2
15									
20									
25									

上記以外の農薬を使用する場合、園芸センターにご相談ください。使用する農薬のラベル表示を確認してから散布しましょう。(平成30年1月12日更新)