

# 平成30年度 ながいも防除暦

必ず出荷前に提出願います！！

JA庄内みどり

生産者(連絡先): \_\_\_\_\_ 日誌ID             拠点コード     帳票ID

部会(年度): \_\_\_\_\_ 部会コード     年度   開始年月   年   月 ステージ

栽培品(品種): やまのいも 生産者コード             圃場コード   -

栽培基準(ステージ): H30ながいも 圃場・面積(地番): \_\_\_\_\_ 栽培基準ID             作   栽培面積     a

| チェック | 管理作業名(適用期) | 実施月日 | コード | 項目名 | データ | 説明 | コード |
|------|------------|------|-----|-----|-----|----|-----|
|      | 植付<br>植付   |      | 022 |     |     |    |     |
|      | 収穫開始<br>収穫 |      | 041 |     |     |    |     |
|      |            |      |     |     |     |    |     |
|      |            |      |     |     |     |    |     |

氏名欄 (ボールペン等で自筆)  
  

印

  

|    |     |              |
|----|-----|--------------|
| 課長 | 処理係 | センター長<br>受付係 |
|----|-----|--------------|

使用可能回数・・・ 使用実績・・・ (基準回数内) - (基準回数なし) × (基準回数オーバー)

| チェック | 用途 | 防除資材名(基準)                         | 区分                       | 使用月日 |   | 使用月日 |   | 使用月日 |   | 使用月日 |   | 回数 | コード |   |   |   |   |   |   |
|------|----|-----------------------------------|--------------------------|------|---|------|---|------|---|------|---|----|-----|---|---|---|---|---|---|
|      |    |                                   |                          | 月    | 日 | 月    | 日 | 月    | 日 | 月    | 日 |    | 回   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| 1    | 殺菌 | アミスター20フロアブル<br>収穫前日まで 2000倍 3回   | 炭疽病・葉渋病                  |      |   |      |   |      |   |      |   |    | 0   | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 4 |
|      | 殺菌 | ガスタード微粒剤<br>30.0kg/10a 植付前21日 1回  | 根腐病・褐色腐敗病・<br>一年生雑草      |      |   | 0    | 0 | 0    | 0 | 0    | 0 | 0  | 0   | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 |
|      | 殺菌 | ティープック水和剤<br>(2秒間浸漬:植付前) 50倍 1回   | 根腐病                      |      |   | 0    | 0 | 0    | 0 | 0    | 0 | 0  | 0   | 0 | 1 | 7 | 1 | 3 | 6 |
|      | 殺菌 | ベルコートフロアブル<br>収穫前7日まで 1000倍 5回    | 炭疽病・葉渋病・青か<br>び病         |      |   |      |   |      |   |      |   |    | 0   | 0 | 1 | 9 | 8 | 8 | 4 |
| 5    | 殺菌 | ラピライト水和剤<br>収穫前14日まで 400倍 4回      | 炭疽病・葉渋病                  |      |   |      |   |      |   |      |   |    | 0   | 0 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 |
|      | 殺菌 | Zボルドー<br>500倍                     | べと病・斑点細菌病・<br>炭疽病・葉渋病・褐斑 |      |   |      |   |      |   |      |   |    | 0   | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|      | 殺虫 | アドマイヤー顆粒水和剤<br>収穫前14日まで 10000倍 2回 | アブラムシ類                   |      |   |      |   | 0    | 0 | 0    | 0 | 0  | 0   | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 |
|      | 殺虫 | アドマイヤー1粒剤<br>4.0kg/10a 植付時 1回     | アブラムシ類・コガネ<br>ムシ類        |      |   | 0    | 0 | 0    | 0 | 0    | 0 | 0  | 0   | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 8 |

| チェック | 用途 | 防除資材名(基準)                             | 区分                        | 使用月日 |   | 使用月日 |   | 使用月日 |   | 使用月日 |   | 回数 | コード |   |   |   |   |   |   |
|------|----|---------------------------------------|---------------------------|------|---|------|---|------|---|------|---|----|-----|---|---|---|---|---|---|
|      |    |                                       |                           | 月    | 日 | 月    | 日 | 月    | 日 | 月    | 日 |    | 回   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|      | 殺虫 | コテツフロアブル<br>収穫前日まで 2000倍 2回           | カンザワハダニ・ナガ<br>イモコガ        |      |   |      |   | 0    | 0 | 0    | 0 | 0  | 0   | 0 | 1 | 9 | 1 | 8 | 4 |
| 10   | 殺虫 | コロマイト乳剤<br>収穫前7日まで 1000倍 2回           | ハダニ類                      |      |   |      |   | 0    | 0 | 0    | 0 | 0  | 0   | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 6 |
|      | 殺虫 | ダニサラバフロアブル<br>収穫前日まで 1000倍 2回         | ハダニ類                      |      |   |      |   | 0    | 0 | 0    | 0 | 0  | 0   | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 |
|      | 殺虫 | マブリック水和剤 20<br>収穫前7日まで 2000倍 2回       | アブラムシ類・ハスモ<br>ンヨトウ・ヤマノイモコ |      |   |      |   | 0    | 0 | 0    | 0 | 0  | 0   | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 4 |
|      | 殺虫 | モスピラン顆粒水溶液<br>収穫前7日まで 4000倍 3回        | アザミウマ類・アブラ<br>ムシ類・ナガイモコガ  |      |   |      |   |      |   | 0    | 0 | 0  | 0   | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | 3 |
|      | 殺虫 | ネマトリンエース粒剤<br>20.0kg/10a(植付前) 1回      | ネコブセンチュウ                  |      |   | 0    | 0 | 0    | 0 | 0    | 0 | 0  | 0   | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 |
| 15   | 除草 | クレマート乳剤<br>400.0ml/10a(植付後萌芽前ま<br>まで) | 一年生雑草                     |      |   | 0    | 0 | 0    | 0 | 0    | 0 | 0  | 0   | 0 | 1 | 7 | 6 | 6 | 0 |
|      | 除草 | クレマートU粒剤<br>6.0kg/10a(植付後萌芽前ま<br>まで)  | 一年生雑草                     |      |   | 0    | 0 | 0    | 0 | 0    | 0 | 0  | 0   | 0 | 1 | 4 | 6 | 4 | 9 |
|      |    |                                       |                           |      |   |      |   |      |   |      |   |    |     |   |   |   |   |   |   |
|      |    |                                       |                           |      |   |      |   |      |   |      |   |    |     |   |   |   |   |   |   |
| 20   |    |                                       |                           |      |   |      |   |      |   |      |   |    |     |   |   |   |   |   |   |
|      |    |                                       |                           |      |   |      |   |      |   |      |   |    |     |   |   |   |   |   |   |
|      |    |                                       |                           |      |   |      |   |      |   |      |   |    |     |   |   |   |   |   |   |
| 25   |    |                                       |                           |      |   |      |   |      |   |      |   |    |     |   |   |   |   |   |   |

上記以外の農薬を使用する場合、園芸センターにご相談ください。使用する農薬のラベル表示を確認してから散布しましょう。(平成30年1月7日更新)